

誤飲・誤食

まずは、何をどのくらい飲んだか確認する。

受診時には、誤飲・誤食したものの成分が確認できる説明書や箱、ビンなどを必ず持参しましょう。

● 次の症状を観察

- 意識がない
- けいれんが止まらない
- 吐き気・おう吐がある
- 呼吸がおかしい
- 塩酸・苛性ソーダ・除草剤・パラコート
有機リン系・殺虫剤・トイレ洗浄剤・
業務用漂白剤の誤飲

ひとつでもあてはまる

救急車を呼ぶ!

(P26 参照)

- 意識があるが、顔色が悪い
- けいれんを起こした
- 飲み込んだ直後に激しくせきこんだ

ひとつでもあてはまる

すぐに受診!

(P29 参照)

- 意識がある
- 活気がある
- 吐き気・おう吐がなく、食欲がある

すべてあてはまる

おうちで様子を見ましょう

症状が改善しない、
悪化するようなら、すぐに受診

★吐かせてはいけない場合

- 6か月未満の乳児
- 意識障害、けいれんがあるとき
- 重症の心臓病、不整脈があるとき



★左記以外で、誤飲した場合の応急処置

品名	応急手当	対応
除光液・灯油・ガソリン・ベンジン等の揮発性物質	何も飲ませない 吐いたものが、気管に入り、肺炎等を起こすので吐かせない。	吐かせない 至急病院へ
トイレ用洗剤・漂白剤等の強酸・強アルカリ	牛乳・卵白を飲ませる 無理に吐かせると食道等の粘膜を傷めるので吐かせない。	吐かせない 至急病院へ
金属・ボタン電池	何も飲ませない 医師に相談し、便の中に出てくるのを待つ。電池は成分が胃の中で溶けることがあるので、すぐ医師に相談する。	吐かせない 病院へ
タバコ	何も飲ませない のどの奥を刺激して、すぐに吐かせる	吐かせる 病院へ
大部分の医薬品	水・牛乳を飲ませる のどの奥を刺激して、すぐに吐かせる	
パラジクロル・ベンゼン・ナフタリン・防虫剤等	水を飲ませる 防虫剤等は油に溶けやすく、毒物の吸収を早めるので、牛乳は飲ませない。	吐かせる 病院へ

〈少量の誤飲ではほとんど無害なもの(1g・1ml未滿)〉

- 食用油
- 酒
- 冷蔵庫用脱臭剤
- 保冷剤
- マッチの先端
- ろうそく
- インク
- クレヨン
- 炭
- 絵の具
- えんぴつ
- 消しゴム
- 墨汁
- 粘土
- 糊
- 石けん
- おしろい
- 口紅
- クリーム
- 化粧水
- 香水
- ベビーオイル
- 乳液
- ベビーパウダー
- 歯磨き粉
- シャンプー
- ヘアトニック
- シリカゲル
- 線香
- 蚊取りマット
- 花火
- 靴墨
- 体温計の水銀

上記の場合でも身体に変化が見られる場合は受診しましょう。



けいれん

発熱

せき

下痢

おう吐

腹痛

発疹

けが・虫さされ

口や歯のけが

やけど

熱中症

くすりの上手な
飲ませ方

坐薬の使い方
くすりのQ&A

誤飲・誤食

異物の
吐かせ方

事故の予防

応急手当

救急車を
呼ぶとき

救急医療の
ご案内