

けいれん

発熱

せき

下痢

おう吐

腹痛

発疹

けが・虫さされ

口や歯のけが

やけど

熱中症

くすりの上手な
飲ませ方

坐薬の使い方
くすりのQ&A

誤飲・誤食

異物の
吐かせ方

事故の予防

応急手当

救急車を
呼ぶとき

救急医療の
ご案内

くすりの上手な飲ませ方

3つの基本ルール

- ①量と回数を守る(自己判断で増減しない)。
- ②市販薬と併用しない。
- ③こどもの手の届かないところに保管する。




〈乳児への飲ませ方〉

- 水薬はそのまま与える。
- 粉薬は少量の水で練り、上あごや頬の内側に塗りつけ、その後水分を与える。

〈幼児への飲ませ方〉

- そのまま与えるか、こどもの好きなもの(アイスクリーム、ヨーグルト、プリン、ゼリー、ジャムなど)に混ぜて与える。



★飲ませる時の注意

- 主食のおかゆやミルクにはなるべく混ぜない。
おかゆやミルク嫌いの原因になることがあります。
- 熱いものに混ぜない。
薬の成分が変化してしまうことがあります。
- 抗生物質の中には、ヨーグルト、酸味のあるジュース、スポーツ飲料に
混ぜると苦味が増すものがあります。



薬は、指示どおりに飲まないと効果が十分発揮できません。
わからないことは、医師・薬剤師に気軽に相談しましょう。