

坐薬の使い方

〈坐薬の使い方〉

- 冷蔵庫で保存する。
- カットする場合は外装の上から、はさみやナイフで切る。
- 坐薬の先を指で温めて丸みをつけたり、オリーブオイルなどを塗ったり（水溶性のものには不可）すると無理なく入ります。奥まで挿入し、しばらく押さえておきましょう。
- 坐薬を入れてすぐ、坐薬の形が残っている状態に出てしまった時は、すぐ追加してよい。30分以上たっていればそのまま様子を見てください。

くすりのQ&A

Q 食後に飲ませる薬なのに、何も食べていない時は？

A 薬だけ与えても大丈夫です。

Q 飲み忘れた時はどうするの？

A 1日3回の薬の場合、4時間間隔をあけて飲ませれば大丈夫です（1日2回の場合は最低6時間、1日1回の場合は8時間）。

Q 眠っているときは、起こして飲ませるの？

A 無理に起こさず、目覚めた時に飲ませましょう。

Q 飲ませたのに、吐いてしまったら？

A 薬を飲んで30分以上たっていれば、もう一度飲ませる必要はありません。飲んで、すぐ全量を吐いた場合は、もう一度飲ませます。

Q 症状が治ったら、飲ませなくてもいい？

A 抗生物質など、飲みきることが必要な薬もあります。医師に確認しましょう。

けいれん

発熱

せき

下痢

おう吐

腹痛

発疹

けが・虫さされ

口や歯のけが

やけど

熱中症

くすりの上手な
飲ませ方

坐薬の使い方
くすりのQ&A

誤飲・誤食

異物の
吐かせ方

事故の予防

応急手当

救急車を
呼ぶとき

救急医療の
ご案内